



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA



1° Circolo Didattico di Pozzuoli  
"Guglielmo Marconi"  
Viale Capomazza, n° 1- 80078 Pozzuoli (NA)  
E-mail: naee16600e@istruzione.it  
Web: www.1circolopozzuoli.it



Polo Qualità Napoli



Unione Europea

Pozzuoli, li 01 settembre 2016

Prot. n. 2347/A35 INFORMATIVA N. 29

**Alle Unità di Primo Soccorso  
del 1° Circolo Didattico Statale di Pozzuoli  
"Guglielmo Marconi"  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** *protocollo per gestione crisi tonico-clonica.*

Il Dirigente Scolastico

RILEVATA

- la presenza, all'interno della platea scolastica di competenza, di soggetti affetti di epilessia

VISTO

- l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- il D.I. 25 novembre 2005;
- le linee guida contro l'epilessia della L.I.C.E. (Lega Italiana Contro l' Epilessia)

RESTITUISCE

i seguenti Principi generali di comportamento per l'assistenza nel caso di crisi tonico-clonica generalizzata:

- l'addetto al primo soccorso scolastico, prima dell'intervento, deve indossare dpi per la protezione delle mani e della bocca;
- il secondo addetto al primo soccorso scolastico deve inoltrare chiamata di emergenza al 118 indicando:
  - se si tratta di una prima crisi o se si verifica in corso di un evento acuto (es. trauma cranico, febbre,..)
  - se la crisi dura più a lungo del comune (2-3 minuti);
  - se la persona tarda a riprendere coscienza (>5 minuti);
  - se le crisi si ripetono;

- se la persona si è procurata lesioni;
- se la persona respira con difficoltà o ha problemi respiratori;

☒ durante la crisi:

- proteggere da eventuali lesioni della testa e del corpo, togliere occhiali e allontanare gli oggetti pericolosi;
- aiutare a respirare slacciando indumenti stretti;
- rimanere vicino al soggetto in crisi ed osservarlo per poter descrivere crisi e relativa durata;
- non cercare di: rialzare la persona o modificarne la posizione, contenere le convulsioni, aprire la bocca a forza e introdurre qualcosa tra i denti, dare qualcosa da bere, praticare la respirazione artificiale;

☒ dopo la crisi:

- posizionare la persona su un fianco (permette la fuoriuscita di saliva e vomito dalla bocca);
- togliere dalla cavità orale eventuali impedimenti alla respirazione;
- restare accanto alla persona finché è confusa e proteggerla;
- non contenere e non somministrare farmaci se la crisi termina spontaneamente e soprattutto niente per bocca finché la persona non ha ripreso coscienza;
- rassicurare utilizzando calma, persuasione, sostegno.

Resta a disposizione per eventuali approfondimenti e gradisce l'occasione per augurare buon lavoro.

**Il Dirigente scolastico**

prof.ssa Angela PALOMBA  
Firma autografa omessa a mezzo stampa  
ai sensi del D. Lgs 39/1993